

EL ALCOHOL Y LAS LESIONES CEREBRALES

Originalmente escrito por la Asociación de Lesiones Cerebrales de Maine

Editado por la Asociación de Lesiones Cerebrales de Minnesota.



34 13th Ave NE, Suite B001
Minneapolis, MN 55413
612-378-2742
800-669-6442
Fax: 612-378-2789
www.braininjurymn.org
E-mail: info@braininjurymn.org

EL CONSUMO DE ALCOHOL Y LAS LESIONES CEREBRALES

- El alcohol está relacionado con más del 50% de todas las lesiones cerebrales.
- En promedio, el 43.5% de las personas con lesiones cerebrales que tienen niveles positivos de alcohol en la sangre al ingresar a la sala de emergencias están legalmente intoxicadas. De este grupo, el 46.5% tiene un historial de adicción.
- Los pacientes con un nivel positivo de alcohol en la sangre muestran una incidencia más alta de hemorragias cerebrales.
- De acuerdo con estadísticas, las personas con un nivel positivo de alcohol en el momento de sufrir una lesión:
 1. Experimentan una duración más prolongada en estado de coma y un nivel menor de conocimiento durante la etapa aguda de recuperación.
 2. Tienden a experimentar una duración mayor de agitación.
 3. Tienden a manifestar un estado cognoscitivo más bajo cuando son dados de alta que las personas que no tenían alcohol en la sangre en el momento de la lesión.
 4. Tienden a requerir una estadía significativamente más larga en el área de cuidado intensivo del hospital que los pacientes libres de alcohol.
 5. Demuestran una recuperación más pobre del aprendizaje verbal y la memoria.

EL CONSUMO DE ALCOHOL LUEGO DE UNA LESIÓN CEREBRAL:

- Retomar el uso de alcohol puede a menudo inhibir perceptiblemente la recuperación cognoscitiva.
- Aproximadamente el 90% de las segundas lesiones cerebrales están relacionadas con el alcohol.
- El consumo de alcohol por individuos que han sufrido lesiones cerebrales incrementa el riesgo de experimentar asimientos.
- Después de una lesión cerebral, el consumo de una bebida alcohólica puede tener el efecto de tres o más bebidas.
- Aproximadamente el 50% de los individuos que han sufrido lesiones cerebrales regresan a consumir los niveles de alcohol de antes de sufrir la lesión en menos de un año luego del accidente.

EL ALCOHOL Y LA POBLACIÓN EN GENERAL:

- El 20% de las caídas que requieren tratamiento en la sala de emergencias están relacionadas con el alcohol.
- El 20% de las muertes por ahogamiento están relacionadas con el alcohol.
- El 20% de las muertes por hipotermia están relacionadas con el alcohol.
- El 25% de las incidencias de sofocación con alimentos están relacionadas con el alcohol.
- El 50% de las muertes en incendios están relacionadas con el alcohol.
- El 60% de los accidentes automovilísticos fatales están relacionados con el alcohol.
- El 60% de los intentos de suicidio están relacionados con el alcohol.
- El 70% de los homicidios están relacionados con el alcohol.
- La mayoría de los casos de abuso infantil y matrimonial están relacionados con el alcohol.
-

Information
copyrighted by
authors listed and
may not be
photocopied for
mass distribution.



34 13th Ave NE, Suite B001
Minneapolis, MN 55413
612-378-2742
800-669-6442
Fax: 612-378-2789
www.braininjurymn.org
E-mail: info@braininjurymn.org

EFFECTOS A LARGO PLAZO POR EL USO DE ALCOHOL:

- Enfermedades cardíacas
- Daños al páncreas
- Daños al hígado
- Degeneración del cerebelo
- Cáncer del esófago
- Úlceras
- Deterioro de la memoria a corto plazo

Traducido por Job Guzmán

Information
copyrighted by
authors listed and
may not be
photocopied for
mass distribution.