CASOS CLÍNICOS

1.- Paciente de 35 años que tras sufrir un traumatismo con rama de olivo en ojo derecho se presenta en el servicio de urgencias a los tres días con un cuadro de ojo rojo doloroso, disminución de la agudeza visual, secreción mucopurulenta, defecto corneal epitelial, edema e infiltración.
¿Cuál considera que serían los microorganismos más frecuentes relacionados con este proceso?
¿Qué tratamiento instauraría para cada uno de ellos?

2.- Mujer de 37 años que sufre episodios de repetición en ojo izquierdo de ojo rojo, fotofobia, lagrimeo, blefarosmasmo y que presenta úlcera dendrítica corneal ¿Qué fármaco estaría contraindicado su uso? Razone su respuesta.

3.- Niño de 10 años que tras pasar el día en el campo presenta de manera súbita un cuadro bilateral de picor, escozor, lagrimeo y sensación de cuerpo extraño en ambos ojos asociado a intensa rinorrea. ¿La activación de quéreceptor a nivel conjuntival es el responsable de dicho cuadro?

4.- En un cuadro de conjuntivitis aguda que presenta secreción serosa, reacción folicular, adenopatías preauriculares y microhemorragias ¿Qué microorganismo estaría más frecuentemente relacionado con el cuadro expuesto?
¿Qué tratamiento instauraría?

5.- Lactante de 9 meses que presenta cuadro de epífora y secreción purulenta desde el memento del nacimiento en ojo derecho. Tras comprimir el saco lagrimal se produce reflujo de material purulento. ¿A qué nivel suele estar el defecto de permeabilización de la vía lagrimal?

6.- Paciente de 40 años de edad con episodios recurrentes de uveitis anterior y con antígeno HLA B27 positivo. ¿Qué otra afectación sería un 30% frecuente encontrarse en él? ¿Qué actitud terapéutica adoptaría?

7.- En un paciente de 35 años adicto a dogras por vía parenteral que presenta un cuadro de disminución de agudeza visual y a la oftalmoscopia se puede ver en fondo de ojo un infiltrado coroideo blanco focal con afectación del vítreo. ¿Qué tratamiento sería el más adecuado?

8.- En el enfermo diagnosticado de enfermedad de Marfan se presenta diplopia monocular. ¿En qué patología deberíamos de pensar como responsable del cuadro? ¿Con qué otros procesos realizaríamos diagnóstico diferencial? ¿Qué tratamiento inicial consideraría?

9.- Paciente de dos años de edad que presenta una ambliopía del ojo derecho. ¿Cuál sería la base del tratamiento?

10.- Mujer de 60 años con diabetes mellitus tipo II de 25 años de evolución ¿Qué signos nos encontraríamos con más frecuencia en fondo de ojo?

11.- Paciente de 70 años que presenta pérdida brusca de ojo derecho cuyo fondo de ojo presenta blanqueamiento difuso y presencia de manchas rojo cereza. ¿Qué cuadro explicaría dicha clínica?

12.- Paciente con EPOC reagudizado que sigue tratamiento tópico para glaucoma. ¿A qué fármaco deberíamos acudir para explicar el agravamiento de su cuadro bronquial?

13.- Paciente de 50 años de edad que acude al servicio de urgencias con cuadro de ojo rojo doloroso con anisocoria (pupila midriática arreactiva), disminución de la agudeza visual, náuseas y vómitos. ¿Qué fármaco prescribiríamos en el tratamiento?

14.- En un paciente con 9 meses cuyos padres nos traen a consulta porque se veía la pupila de un ojo blanca ¿Qué enfermedad no incluiríamos dentro de nuestro diagnóstico diferencial?

15.- Paciente de 80 años que presenta pérdida brusca visual, indolora de ojo derecho en los últimos dos días. En el fondo de ojo existe tumefacción pálida de la papila, con hemorragias en llama y focos blancos algodonosos. ¿Cuál sería la base del tratamiento?